

مقایسه ساختار ژنتیکی دو جمعیت کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) در مناطق قره‌سو و انزلی با استفاده از هشت نشانگر ریزماهوره

ملیکا قلیچ‌پور، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
علی شعبانی*، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
بهاره شعبانپور، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) یکی از گونه‌های با ارزش ماهیان استخوانی است که در نواحی جنوبی دریای خزر از نظر اقتصادی حایز اهمیت است. در دهه‌های اخیر بازسازی ذخایر ماهی کپور معمولی از طریق تکثیر مصنوعی صورت می‌گیرد که می‌تواند تنوع ژنتیکی را دستخوش تغییراتی کند. در این تحقیق، برای بررسی ساختار جمعیتی ماهی کپور معمولی تعداد ۵۶ نمونه ماهی از مناطق انزلی و قره‌سو (۲۸ نمونه از هر منطقه) جمع‌آوری شد. DNA نمونه‌ها به روش فنل-کلروفرم استخراج و با استفاده از ۸ جایگاه ژنی ریزماهوره‌ای بررسی شد. طبق نتایج حاصل محدودده تعداد آلل، متوسط هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب ۱۱-۱۸، ۰/۹۰ و ۱/۰۰۰ به دست آمد. آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع بالایی (۹۹ درصد) در درون جمعیت‌های مورد بررسی وجود دارد. میزان شاخص F_{ST} ۰/۰۱۷ به دست آمد که نشان‌دهنده وجود تمایز ژنتیکی پایین بین مناطق انزلی و قره‌سو است که علت آن را می‌توان مهاجرت طبیعی ماهیان عنوان کرد. ۱۳ نمونه از ۱۶ آزمون مورد بررسی، انحراف معنی داری ($P \leq 0/05$) از تعادل هاردی-واینبرگ نشان دادند که علت عمده آن را می‌توان به افزایش هتروزیگوسیتی نسبت داد. همچنین نتایج حاصل از ترسیم دندروگرام بیانگر تمایز ژنتیکی دو جمعیت مورد بررسی است. با توجه به نتایج حاصل، می‌توان بیان داشت که جمعیت‌های مورد بررسی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی قابل قبولی برخوردارند. همچنین وجود هتروزیگوسیتی بالا در منطقه قره‌سو، گویای جریان ژنی بالا در این منطقه بوده که تأثیرات منفی تکثیر مصنوعی بر تنوع ژنتیکی را خنثی می‌کند.

واژه‌های کلیدی: انزلی، تعادل هاردی-واینبرگ، تنوع ژنتیکی، ریزماهوره، قره‌سو، ماهی کپور معمولی

مقدمه

پراکنش یافته‌اند (Kirpichnikov, 1972). ماهی کپور

معمولی (*Cyprinus carpio*) از خانواده Cyprinidae،

بومی آسیای مرکزی است که طی قرن‌های متمادی در

کپورماهیان یکی از خانواده‌های مهم ماهیان هستند

که با داشتن بیش از ۲۰۰۰ گونه در چهار قاره جهان

بر ذخایر ژنتیکی آبیان اثبات شده و هم اکنون نیز بخشی از ذخایر این گونه از تکثیر مصنوعی حاصل می‌گردد، اطلاع از وضعیت ژنتیکی این گونه بسیار ضروری است. بدین منظور نشانگرهای مختلفی در بررسی‌های ژنتیک جمعیت استفاده می‌شوند، اما در میان این نشانگرها، نشانگرهای ریزماهواره به علت فراوانی و گستردگی بالا در ژنوم، همباز بودن، توارث مندلی، کوچک بودن اندازه جایگاه ژنی و در نتیجه، سهولت تعیین ژنوتیپ از طریق واکنش زنجیره‌ای پلیمرز و همچنین پلی مورفیسم بالا دارای کاربرد گسترده‌تری هستند (Chen *et al.*, 2008).

ریزماهواره‌ها به علت بالا بودن تعداد آلل‌هایشان در میان تمام نشانگرها بالاترین میزان هتروزیگوسیتی را نشان می‌دهند (Liu, 2007). این پلی مورفیسم بسیار بالا نشان می‌دهد که نشانگرهای ریزماهواره می‌توانند برای آنالیز ژنتیک جمعیت و تعیین نژادها بسیار مفید باشند (Dunham, 2004).

علیرغم اهمیت اقتصادی ماهی کپور معمولی و همچنین اهمیت آن در بحث بازسازی ذخایر و انتخاب مولدین، اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ساختار جمعیتی این گونه در مناطق مختلف موجود نیست. اطلاعات موجود، محدود به بررسی صورت گرفته توسط لالوئی و همکاران (۱۳۸۷) روی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی در برخی از نواحی حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از روش mtDNA (PCR-RFLP) است. لذا در این تحقیق از نشانگر ریزماهواره برای ارزیابی هرچه بهتر ساختار جمعیتی این گونه در مناطق قره‌سو و انزلی که از مناطق مهم پراکنش این ماهی هستند استفاده شد.

نواحی مختلف جهان گسترش پیدا کرده است (Kohlmann *et al.*, 2003). ماهی کپور معمولی از گونه‌های اقتصادی دریای خزر است و به عنوان منبع غذایی مهمی محسوب می‌گردد. هرچند این گونه به صورت بومی و طبیعی در تمام سواحل دریای خزر وجود دارد و برای تولید مثل وارد مصب رودخانه‌ها می‌شود، اما در سال‌های اخیر به علت صید بیش از حد و از بین رفتن محل‌های تولید مثل، نسل آن کاهش پیدا کرده؛ به طوری که جزو گونه‌های نیازمند به حفاظت در منطقه به‌شمار می‌رود (عبدلی و نادری، ۱۳۸۷).

هم اکنون، حفاظت و بازسازی ذخایر این ماهی با ارزش در ایران از طریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان تولیدی در آب‌های طبیعی صورت می‌پذیرد. بررسی انجام شده توسط Blanchet و همکاران در سال ۲۰۰۸ بر روی آزاد ماهی اقیانوس اطلس نشان داد که با وجود فواید بالقوه در این شیوه تکثیر، تغییرات مورفولوژیک و ژنتیکی بارزی در میان نمونه‌های تکثیر مصنوعی و وحشی دیده می‌شود و این روش در طولانی مدت می‌تواند به کاهش تنوع ژنتیکی درون جمعیتی ذخایر ژنی بومی منجر گردد (Machado *et al.*, 2007). تنوع ژنتیکی منابع دریایی اهمیتی حیاتی برای مدیریت و حفاظت از آنها داشته، به عنوان اولین پیش‌نیاز برای حفظ سازگاری جمعیت‌ها در شرایط محیطی در حال تغییر محسوب می‌گردد (Diz and Persa, 2009). لذا اطلاعات درباره تاریخچه جمعیت‌ها و ساختار ژنتیکی آن‌ها برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به حفاظت از گونه‌هایی که در معرض تکثیر مصنوعی قرار دارند، سودمند خواهد بود (Zhang *et al.*, 2002). بنابراین، با توجه به اینکه اثر روش‌های تکثیر مصنوعی

مواد و روش‌ها

نمونه‌برداری و استخراج DNA

۵۴ ماهی کپور معمولی از مصب مناطق رودخانه قره‌سو (استان گلستان، ۳۶/۹۷ درجه شمالی و ۵۳/۹۹ درجه شرقی) و تالاب انزلی (استان گیلان، ۳۷/۴۷ درجه شمالی و ۴۹/۴۷ درجه شرقی) صید شد (به طور متوسط ۲۸ نمونه از هر منطقه). نمونه‌برداری‌ها به صورت کاملاً تصادفی انجام شد. حدود ۲-۳ گرم از باله پستی هر ماهی جمع‌آوری و تا زمان استخراج DNA در الکل اتیلیک ۹۶ درصد قرار داده شد.

استخراج DNA، با استفاده از روش فنل-کلروفرم انجام پذیرفت (Hillis et al., 1996). DNAهای استخراجی پس از افزودن ۱۰۰ میکرولیتر آب مقطر استریل تا زمان انجام آزمایش‌های مربوط در فریزر -۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. کیفیت و کمیت DNAهای استخراجی، با استفاده از روش الکتروفورز با ژل آگاروز ۱ درصد و اسپکتروفتومتر تعیین شد (Sambrook et al., 1989).

آنالیز مولکولی

هشت جایگاه ژنی ریزماهوره MFW2، MFW7، MFW13، MFW16، MFW17، MFW20، MFW26 (Crooijmans et al., 1997) و CypG24 (Baerwald and May, 2004) از مطالعات انتشار یافته انتخاب شدند (جدول ۱).

واکنش‌های زنجیری پلیمرز (PCR) برای هر یک از آغازگرها انجام شد و بهترین دمای الحاق برای هر یک از آن‌ها به دست آمد. تکثیر جایگاه‌های ژنی با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمرز در حجم ۲۵ میکرولیتری و شرایطی شامل ۱۵ نانوگرم DNA، ۰/۵ میکرومولار از هر پرایمر، ۴۰۰ میکرومولار نوکلئوتیدها، یک واحد بین‌المللی تگ DNA پلیمرز، بافر PCR ۱X، ۱/۵ میلی‌مولار کلرید منیزیم و آب مقطر تا رسیدن به حجم انجام شد. شرایط سیکل دمایی و مشخصات داده شده به دستگاه ترموسایکلر برای واکنش زنجیره‌ای پلیمرز در جدول ۲ آورده شده است.

جدول ۱- توالی و ویژگی‌های پرایمرهای مورد استفاده در آنالیز ریزماهوره ماهی کپور معمولی

جایگاه ژنی	تعداد آل	اندازه آل	توالی	دمای اتصال (درجه سانتی‌گراد)
MFW2	۲۲	۲۰۰-۲۸۸	F: CACACCGGGCTACTGCAGAG R: GTGCAGTGCAGGCAGTTTGC	۶۴
MFW7	۲۲	۱۶۰-۲۷۲	F: TACTTTGCTCAGGACGGATGC R: ATCACCTGCACATGGCCACTC	۶۲
MFW13	۱۷	۱۸۸-۲۷۲	F: ATGATGAGAACATTGTTTACAG R: TGAGAGAACAATGTGGATGAC	۵۶
MFW16	۱۸	۱۲۸-۲۰۴	F: GTCCATTGTGTCAAGATAGAG R: TCTTCATTTCAAGGCTGCAAAG	۵۷
MFW17	۲۵	۲۰۸-۳۱۶	F: CTCAACTACAGAGAAATTTTCATC R: GAAATGGTACATGACCTCAAG	۵۷
MFW20	۱۹	۲۰۸-۳۰۴	F: CAGTGAGACGATTACCTTGG R: GTGAGCAGCCACATTGAAC	۶۰
MFW26	۱۶	۱۰۸-۱۷۲	F: CCCTGAGATAGAAACCACTG R: CACCATGCTTGGATGCAAAAAG	۶۰
CypG24	۱۴	۱۱۲-۱۶۸	F: CTGCCGCATCAGAGATAAACACTT R: TGGCGGTAAGGGTAGACCAC	۵۸

جدول ۲- چرخه حرارتی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

تعداد چرخه	مرحله	زمان	دما (درجه سانتی‌گراد)
۱ چرخه	واسرشت	۵ دقیقه	۹۴
	واسرشت	۳۰ ثانیه	۹۴
۵ چرخه	اتصال	۳۰ ثانیه	۵ درجه بالاتر از دمای اتصال*
	تکثیر	۳۰ ثانیه	۷۲
	واسرشت	۳۰ ثانیه	۹۴
۳۲ چرخه	اتصال*	۳۰ ثانیه	دمای مشخص شده (۵۶-۶۴)
	تکثیر	۳۰ ثانیه	۷۲
۱ چرخه	تکثیر نهایی	۱۰ دقیقه	۷۲

(Goudet, 2001) نیز برای تعیین شاخص درون‌آمیزی (F_{IS}) و سطح معنی‌داری آن استفاده شد. شیوه توزیع تنوع مشاهده شده و همچنین میزان تمایز بین مناطق با استفاده از معیار F_{ST} و تحت آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) نرم‌افزار GeneAlex محاسبه گردید. مقادیر فاصله (D) و شباهت ژنتیکی (I) (Nei, 1978) و رابطه فیلوژنیک بین جمعیت‌ها با استفاده از ترسیم درخت UPGMA نیز با استفاده از نرم‌افزار PopGene (Yeh *et al.*, 1999) صورت گرفت. به منظور تعیین تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی و همچنین، میزان تمایز بین جمعیتی بر اساس مدل اللی بی‌نهایت (F_{ST}) و مدل جهش پله‌ای (R_{ST}) با استفاده از آنالیز واریانس مولکولی بسته نرم‌افزاری GeneAlex استفاده شد.

مشاهدات

در مجموع ۸ جایگاه ژنی در این تحقیق استفاده شد که همگی پلی‌مورف بودند. تعداد الل‌های مربوط به تمامی جایگاه‌های پلی‌مورف در جدول ۱ نشان داده شده است. متوسط تعداد الل‌ها در مناطق قره‌سو و انزلی به ترتیب ۱۶ و ۱۴ به دست آمد. همچنین، کمترین و بیشترین میزان الل‌ها به ترتیب در جایگاه‌های CypG24

محصولات واکنش زنجیره‌ای پلیمراز بر روی ژل پلی‌آکریل‌آمید ۱۰ درصد (غیر یونیزه) جداسازی و ژل‌ها به روش نیترا نقره رنگ‌آمیزی شدند (Bassam *et al.*, 1991). پس از تهیه تصویر ژل‌ها توسط دستگاه مستندساز ژل (Gel Doc XR, BIO-RAD)، از نرم‌افزار Gel pro analyzer برای محاسبه طول قطعات استفاده شد.

آنالیز آماری

ارزیابی تعداد الل در هر جایگاه ژنی، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار در بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌ها و همچنین آزمون انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ با استفاده از نرم‌افزار GenAlex 6.3 (Peakall and Smouse, 2006) صورت گرفت. برای تعیین تفاوت بین دو منطقه در مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده (H_o)، مورد انتظار (H_e) و تنوع آلی از آزمون ویلکا کسون غیر پارامتریک در نرم‌افزار SPSS (ver 18) استفاده شد (Zar, 1999). برای تنظیم سطح معنی‌داری آزمون‌های تکرار شونده نیز ضریب تصحیح بونفرونی استفاده شد (Rice, 1989). از نرم‌افزار FSTAT (ver 2.9.3)

در سطح مناطق مورد بررسی، تعداد الل مشاهده شده و مؤثر و همچنین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار در جدول ۳ آورده شده است.

(۱۱ الل) و (۱۸ الل) MFW2 مشاهده شد. الل‌های مؤثر نیز در محدوده ۶/۹۶-۱۴/۶۳ به دست آمد که در این میان، پایین‌ترین میزان در جایگاه MFW17 (۶/۹۶) و بالاترین آن در جایگاه MFW20 (۱۴/۶۳) قرار داشت.

جدول ۳- تنوع ژنتیکی جایگاه‌های ژنی مورد استفاده در جمعیت‌های مورد بررسی

جایگاه ژنی	پارامتر	MFW2	MFW7	MFW13	MFW16	MFW17	MFW20	MFW26	GyPG24		
										منطقه	قره‌سو
Na	۲۰	۱۱	۱۴	۱۶	۲۱	۱۸	۱۶	۱۲			
Ne	۱۴/۵۱	۹/۰۴	۱۰/۴۶	۱۲/۱۶	۱۲/۲۴	۱۴/۶۳	۱۲/۰۸	۹/۱۳			
Ho	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			
He	۰/۹۳	۰/۸۸	۰/۹۰	۰/۹۱	۰/۹۱	۰/۹۳	۰/۹۱	۰/۸۹			
Na	۱۶	۱۷	۱۶	۱۰	۱۳	۱۶	۱۴	۱۰			
Ne	۱۲/۶۳	۱۱/۸۶	۱۱/۱۷	۷/۷۲	۶/۹۶	۱۳/۵۲	۹/۵۲	۸/۰۴			
Ho	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			
He	۰/۹۲	۰/۹۱	۰/۹۱	۰/۸۷	۰/۸۵	۰/۹۲	۰/۸۹	۰/۸۷			

Na: تعداد الل‌های مشاهده شده، Ne: تعداد الل‌های مؤثر، Ho: هتروزیگوسیتی مشاهده شده، He: هتروزیگوسیتی مورد انتظار

جایگاه ژنی-جمعیت (۲ جمعیت در ۸ جایگاه ژنی) تنها سه آزمون در تعادل بودند.

متوسط شاخص درون‌آمیزی (F_{IS}) ۰/۰۸- به دست آمد. متوسط میزان F_{ST} بین نمونه‌های مناطق مورد بررسی بر اساس فراوانی الل‌ها، ۰/۱۷ به دست آمد. در سطح جایگاه‌های ژنی نیز میزان تمایز (F_{ST}) محاسبه شد (جدول ۴)، کمترین میزان تمایز مشاهده شده (۰/۰۰۸) MFW20 و بیشترین میزان آن (۰/۰۳۸) در جایگاه ژنی MFW17 به دست آمد. همچنین، جریان ژنی بالایی (میانگین: ۱۸/۹۷) در سطح جایگاه ژنی مشاهده گردید.

میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) ۱/۰۰۰ به دست آمد. متوسط هتروزیگوسیتی مورد انتظار (He) نیز ۰/۹۰ به دست آمد که بالاترین (۰/۹۳) و پایین‌ترین (۰/۸۵) میزان آن به ترتیب در جایگاه‌های MFW20 (منطقه قره‌سو) و MFW17 (منطقه انزلی) مشاهده شد. همچنین از نظر تعداد الل‌ها و میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار، بین نمونه‌های مناطق مورد بررسی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ($P > ۰/۰۵$).

انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ برای تمام ترکیبات لکوس جمعیت محاسبه شد. انحراف از تعادل بالایی در اکثر جایگاه‌های ژنی مشاهده شد؛ هر چند پس از ضریب تصحیح بونفرونی، از میان ۱۶ آزمون

جدول ۴- میزان جریان ژنی (Nm) و تمایز (F_{ST}) در سطح ده جایگاه ژنی مورد استفاده

جایگاه ژنی	MFW2	MFW7	MFW13	MFW16	MFW17	MFW20	MFW26	GyPG24
Nm	۲۷/۲۹	۱۵/۱۳	۱۷/۵۴	۱۶/۵۶	۶/۲۵	۳۲/۲۱	۲۵/۷۱	۱۱/۰۵
F_{ST}	۰/۰۰۹	۰/۰۱۶	۰/۰۱۴	۰/۰۱۵	۰/۰۳۸	۰/۰۰۸	۰/۰۱۰	۰/۰۲۲

میزان شباهت و فاصله ژنتیکی بین مناطق نیز به ترتیب ۰/۶۸ و ۰/۳۷ به دست آمد (جدول ۶). دندروگرام UPGMA بر اساس مقدار فاصله ژنتیکی نیز نشان داد که این دو منطقه در دو شاخه مجزا قرار دارند.

با توجه به نتایج آنالیز واریانس مولکولی (جدول ۵) نتایج F_{ST} حاصل از آنالیز واریانس مولکولی در سطح ۹۹ درصد نشان داد که تنوع ژنتیکی بالایی (۹۹ درصد) درون جمعیت‌ها و تنوع پایینی (۱ درصد) بین جمعیت‌ها وجود دارد که در شکل ۱ نیز نشان داده شده است.

جدول ۵- آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA). df: درجه آزادی، SS: مجموع مربعات، MS: انحرافات میانگین مربع،

Prob: معنی دار بودن انحراف پس از ۹۹ جایگزینی تصادفی

Prob	Value	Stat	%	Est. var.	MS	SS	df	
-	-	-	۱ درصد	۰/۰۵	۶/۷۵۵	۶/۷۵۵	۱	بین جمعیت‌ها
۰/۰۱۰	۰/۰۱۵	F_{ST}	۹۹ درصد	۳/۶۸۶	۳/۶۸۶	۴۰۵/۴۵۹	۱۱۰	درون جمعیت‌ها

شکل ۱- توزیع تنوع ژنتیکی تحت معیار F_{ST}

جدول ۶- ماتریس فاصله و شباهت ژنتیکی (عدد بالای قطر مربوط به شباهت ژنتیکی و زیر قطر مربوط به فاصله ژنتیکی است)

منطقه	قره‌سو	انزلی
قره‌سو		۰/۶۸
انزلی	۰/۳۷	

بحث و نتیجه‌گیری

ریزماهوره‌ها نشانگرهای ژنتیکی هستند که به صورت گسترده‌ای در مطالعات ژنتیک جمعیت گونه‌های پرورشی و وحشی ماهیان استفاده می‌شوند (Liu *et al.*, 2009). در این بررسی برای تعیین ساختار ژنتیکی ماهی کپور معمولی در مناطق قره‌سو و انزلی که از مناطق مهم پراکنش این ماهی هستند، از ۸ جایگاه ژنی ریزماهوره استفاده شد که همگی پلی‌مورف بودند.

هتروزیگوسیتی و تعداد آلل‌ها جزو پارامترهای مهم تنوع ژنتیکی جمعیت‌ها از لحاظ روبه‌رو شدن با تغییرات محیطی هستند (Frankham, 2008) و ویژگی‌هایی همچون قابلیت رقابت و توانایی یک موجود برای بقا در زیستگاه‌های طبیعی را تعیین می‌سازد (Hakansson and Jensen, 2005).

در بررسی‌های تنوع ژنتیکی، غنای آللی نسبت به هتروزیگوسیتی دارای ارزش بالاتری است. در واقع، بالا بودن غنای آللی نشان‌دهنده بالا بودن اندازه مؤثر جمعیت و استفاده از غنای آللی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌هایی که برای برنامه‌های به‌گزینی یا حفاظت انتخاب شده‌اند، مناسب‌تر است (Diz and Persa, 2009). در این بررسی، میانگین مقادیر به دست آمده برای تعداد آلل‌ها، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار بالاتر از مقادیر گزارش شده توسط Crooijmans و همکاران (۱۹۹۷) برای کپور معمولی در اروپا با استفاده از پرایمرهای مشابه بود. این اختلاف ممکن است در نتیجه تفاوت در تعداد نمونه‌ها باشد، اما می‌تواند حاکی از تنوع ژنتیکی بالاتر در جمعیت‌های کپور معمولی در مناطق مورد بررسی نیز باشد. همچنین آنها بیان کردند که تعداد آلل و هتروزیگوسیتی می‌تواند

تحت تأثیر تعداد نمونه و منطقه هدف باشد. در مجموع، تفاوت معنی‌داری ($P > 0.05$) از لحاظ تعداد آلل و هتروزیگوسیتی بین مناطق مورد بررسی مشاهده نشد.

همچنین، نتایج نشان داد که میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده در سطح جمعیت‌های مورد بررسی نسبت به مقادیر مشاهده شده در ماهیان آب شیرین و آنادروموس (Anadromous) (Dewoody and Avise, 2000) بالاتر است، در حالی که متوسط تعداد آلل‌ها تقریباً مشابه با تعداد آلل‌های گزارش شده در بررسی ریزماهوره‌ای جمعیت ماهیان آب شیرین بود (Hekel *et al.*, 2002). این مسأله کارآمدی بیشتر استفاده از تعداد آلل نسبت به هتروزیگوسیتی را در بررسی‌های ژنتیک جمعیت تأیید می‌کند.

در بررسی تعادل هاردی-واینبرگ، ۱۳ نمونه از ۱۶ آزمون مورد بررسی (جایگاه ژنی × منطقه) پس از اعمال ضریب تصحیح بونفرونی انحراف معنی‌داری ($P < 0.005$) از تعادل نشان دادند. با توجه به نتایج حاصل در این تحقیق، می‌توان اذعان نمود که اغلب جایگاه‌های ژنی انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ را نشان می‌دهند که در اکثر موارد، این انحراف به علت افزایش هتروزیگوسیتی است. در واقع، با مقایسه هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار در میان جمعیت‌ها و تمام جایگاه‌های ژنی مورد بررسی در این تحقیق، مشاهده می‌شود که میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده از میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار بیشتر بوده، که این همان افزایش هتروزیگوسیتی است. انحراف از تعادل در این جمعیت‌ها می‌تواند بر اثر اختلاط جمعیت‌ها و یا جفت‌گیری غیرتصادفی نیز باشد (Liu *et al.*, 2005).

بررسی نیز حاکی از وجود جریان ژنی بالا بین مناطق مورد بررسی است. در بررسی مقادیر فاصله و شباهت ژنتیکی نیز فاصله ژنتیکی نسبتاً پایینی بین مناطق مورد بررسی مشاهده شد. در صورت عدم جریان ژنی و یا جریان ژنی اندک بین جمعیت‌ها انتظار می‌رفت تمایز ژنتیکی قابل ملاحظه‌ای بین آنها ایجاد گردد. جریان ژنی بالا می‌تواند ناشی از مهاجرت طبیعی ماهی و همچنین روش رهاسازی لاروهای حاصل از تکثیر مصنوعی در مراکز تکثیر باشد که در این روش لاروهای به دست آمده را بدون توجه به محل صید مولدین در مکان‌های مختلف رهاسازی می‌کنند. داده‌های حاصل بیان می‌کند که علیرغم مسایلی همچون جمعیت بسته دریای خزر و تکثیر مصنوعی تنوع ژنتیکی ماهی کپور معمولی هنوز در سطح قابل توجهی قرار دارد. به نظر می‌رسد تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان در طبیعت، هنوز اثر درخور توجهی روی سطح تنوع ژنتیکی ماهی کپور معمولی نداشته، با وجود این، با توجه به این حقیقت که بازسازی ذخایر این ماهی از طریق تکثیر مصنوعی در حال انجام بوده، در آینده نیز ادامه خواهد یافت، ایجاد تدابیری برای حفظ و تقویت تنوع ژنتیکی مشاهده شده است و اجتناب از مشکلات حاصل از درون‌آمیزی و برون‌آمیزی ضروری به نظر می‌رسد.

به طور کلی، یک عامل به تنهایی نمی‌تواند انحراف از تعادل را توضیح دهد، اما مجموعه‌ای از عوامل ناشی از تکثیر مصنوعی و برنامه‌های بازسازی ذخایر می‌توانند در ایجاد افزایش و انحراف از تعادل در جمعیت‌های مورد بررسی دخیل باشند.

سدهای محیطی، فرآیندهای تاریخی و پیشینه زندگی، همانند روش جفت‌گیری از عواملی هستند که هر کدام تا حدودی ساختار ژنتیکی جمعیت‌ها را شکل می‌دهند (Tiedemann *et al.*, 2000). آنالیز واریانس مولکولی به عنوان یک آنالیز آماری، وسیله مناسبی برای مشخص کردن ساختار جمعیت و میزان تمایز ژنتیکی بین جمعیت‌هاست (Grassi *et al.*, 2004). نتایج آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که ۹۹ درصد تنوع در درون جمعیت‌ها و تنها ۱ درصد بین جمعیت‌ها وجود دارد. مقدار به دست آمده F_{ST} (۰/۰۱۷) نیز تمایز اندکی را بین جمعیت‌ها نشان داد. بر اساس معیار Wright (۱۹۷۸) میزان F_{ST} بین ۰ تا ۰/۰۵ نشان‌دهنده تمایز اندک است. میزان شباهت و فاصله ژنتیکی بین دو منطقه نیز به ترتیب ۰/۶۸ و ۰/۳۷ به دست آمد که بر اساس مقادیر شباهت ژنتیکی گزارش شده برای جمعیت‌های هم‌گونه (۰/۸-۰/۹) و هم‌جنس (۰/۸۵-۰/۳۵) (Thorpe, 1982) می‌توان بیان نمود که جمعیت‌های مورد بررسی از نظر شباهت ژنتیکی در محدوده جمعیت‌های همجنس قرار می‌گیرند. نتایج این

منابع

لالوئی، ف.، رضوانی گیلکلائی، س.، فاطمی، س. م.، ر.، تقوی، م. ج. (۱۳۸۷) بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP)، مجله علمی شیلات ایران. ۱۷: ۸۹ -

۱۰۱.

عبدلی، ا.، و نادری، م. (۱۳۸۷) تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبریان، تهران.

- Baerwald M. R. and May B. (2004) Characterization of microsatellite loci for five members of the minnow family Cyprinidae found in the Sacramento-San Joaquin Delta and its tributaries. *Molecular Ecology* 4: 385-390.
- Bassam, B. J., Caetano-Anolles, G. and Gresshoff, G. M. (1991) Fast and sensitive silver staining of DNA in polyacrylamide gels. *Annual Biochemistry* 84: 680-683.
- Blanchet, S., Paez, D., Bernatchez, L. and Dodson, J. (2008) An integrated comparison of captive-bred and wild Atlantic salmon (*Salmo salar*): Implications for supportive breeding programs. *Biological Conservation* 141: 1989-1999.
- Chen, L., Li, Q. and Yang, J. (2008) Microsatellite genetic variation in wild and hatchery populations of the sea cucumber (*Apostichopus Japonicus Selenka*) from northern China. *Aquaculture Research* 39: 1541-1549.
- Crooijmans, R. P. M. A., Bierbooms, V. A. F., Komen, J., Van der poal, J. J. and Groenen, M. A. M. (1997) Microsatellite markers in common carp (*Cyprinus carpio* L.). *Animal genetics* 28:129-134.
- Dewoody, J. A. and Avise, J. C. (2000) Microsatellite variation in marine, freshwater and anadromous fishes compared with other animals. *Journal of Fish Biology* 56: 461-473.
- Diz, P.A. and Presa, P. (2009) The genetic diversity pattern of *Mytilus alloprovincialis* in Galician Rías (NW Iberian estuaries). *Aquaculture* 287: 278-285.
- Dunham, R. A. (2004) *Aquaculture and Fisheries Biotechnology Genetic Approaches*. Commonwealth Agricultural Bureaux International (CABI) Publishing, Oxfordshire.
- Frankham, R. (2008) Genetic adaptation to captivity in species conservation programs. *Molecular Ecology* 17: 325-333.
- Goudet, J. (2001) FSTAT, a program to estimate and test gene diversities and fixation indices (version 2.9.3). Retrieved from <http://www2.unil.ch/popgen/softwares/fstat.htm>. on: 22 June 2008.
- Grassi, F., Imazio, S., Gomasasca, S., Citterio, S., Aina, R., Sgorbati, S., Sala, F., Patrignani, G. and Labra, M. (2004) Population structure and genetic variation within *Valeriana wallrothii* Kreyer in relation to different ecological locations. *Plant Science* 166: 1437-1441.
- Hakansson, J. and Jensen, P. (2005) Behavioural and morphological variation between captive populations of red junglefowl (*Gallus gallus*)- possible implications for conservation. *Biological Conservation* 122: 431-439.
- Heckel, G., Zbinden, M., Mazzi, D., Kohler, A., Reckeweg, G., Bakker, T. C. M. and Largiader, G. (2002) Microsatellite markers for the three-spined stickleback (*Gasterosteus aculeatus*) and their applicability in freshwater and anadromous population. *Conservation Genetics* 3: 79-81.
- Hillis, D. M., Mable, B. K., Larson, A., Davis, S. K. and Zimmer, E. A. (1996) Nucleic Acids IV: sequencing and cloning. In: *Molecular systematics* (eds. Hillis, D. M., Moritz, C. and Mable, B. K.) 321-384. Sinauer Associates, Sunderland.
- Kirpichnikov, V. S. (1972) Methods and effectiveness of Rop-sha carp breeding. Communication I. breeding aims, original forms and cross system. *Russian Journal of Genetics* 8(1): 65-72.
- Kohlmann, K., Gross, R., Murakaeva, A. and Kersten, P. (2003) Genetic variation And structure of common carp populations throughout the distribution range inferred from allozyme, microsatellite and mtDNA marker. *Aquatic Living Resources* 16: 421-431.
- Liu, F., Xia, J. H., Bai, Z. H., Fu, J. J., Li, J. L. and Yue, G. H. (2009) High genetic diversity and substantial population differentiation in grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) revealed by microsatellite analysis. *Aquaculture* 297: 51-56.

- Liu, Y., Chen, S., Li, J., and Li, B. (2005) Assessing the Genetic structure of three Japanese flounder (*Paralichthys olivaceus*) stocks by microsatellite markers. *Aquaculture* 243: 103-111.
- Liu, Z. (2007) *Aquaculture Genome Technologies*. Blackwell Publishing, Oxford.
- Machado-Schiaffino, G., Depico, E. and Garcia-Vazquez, E. (2007) Genetic variation losses in Atlantic salmon stocks created for supportive breeding. *Aquaculture* 264: 59-65.
- Nei, M. (1978) Estimation of average heterozygosity and genetic distance from small number of individuals. *Genetics* 89: 583-590.
- Peakall, R. and Smouse, P. E. (2006) GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. *Molecular Ecology Notes* 6: 288-295.
- Rice, W. R. (1989) Analyzing tables of statistical tests. *Evolution* 43: 223-225.
- Sambrook, J., Fritsch, E. F. and Maniatis, T. (1989) Electrophoresis of RNA through gels containing formaldehyde. In: *Molecular cloning: A laboratory manual*. (eds. Ford, N., Nolan, C. and Fregusen, M.) 743-745. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.
- Thorpe, J. P. (1982) The molecular clock hypothesis: biochemical evolution, genetic differentiation and systematic. *Annual Review of Ecology and Systematics* 13: 139-168.
- Tiedemann, R., Hardy, O., Vekemans, X. and Milinkovitch, M. C. (2000) Higher impact of female than male migration on population structure in large mammals. *Molecular Ecology* 9: 1159-1163.
- Wright, S. (1978) *Evolution and the genetics of populations: variability within and among natural*
- Yeh, F. C., Yang, R. C. and Boyle, T. (1999) POPGENE version 1.3.1. Microsoft Window-bases Freeware for population Genetic Analysis. Retrieved from <http://www.uallberta.ca/fyeh>. On: 11 September 2008.
- Zar, J. H. (1999) *Biostatistical analysis*, 4th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jwesity.
- Zhang, Y. P., Wang, X. X., Ryder, O. A., Li, H. P., Zhang, H. M., Yong, Y. and Wang, P. Y. (2002) Genetic diversity and conservation in endangered animal species. *Pure Applied Chemistry* 74: 575-584.

Genetic diversity of the two populations of Common carp (*Cyprinus carpio*) in Gharahsu and Anzali regions using eight microsatellite markers

Melika Ghelichpour, Ali Shabani * and Bahareh Shabanpour

Department of Fisheries College, Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources, Gorgan

Abstract

Common carp (*Cyprinus carpio*) is regarded as one of the economically important bony fish species in south Caspian Sea. In recent decades, stock rebuilding programs of common carp were carried out by artificial propagation of wild caught broodstocks that might disturb genetic diversity. In this study, 56 fish were collected from Gharahsu and Anzali regions (28 samples in each region) to investigate the populations' structure. DNA were extracted by phenol-chloroform method and investigated for 8 microsatellite loci. Results showed that the range of allele number, expected and observed heterozygosity, were 11-18, 0.90 and 1.00, respectively. The analyses of molecular variance showed high genetic diversity (99%) within populations. The F_{st} value was 0.017 which indicates the low genetic differentiation between the Gharahsu and Anzali populations that could be because of the natural migration of fish. 13 out of 16 investigated tests showed significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium ($p < 0.05$), mostly due to the excess of heterozygosity. UPGMA cluster analysis based on Nei genetic distance showed there are two different populations inhabited in these regions. The results could be of interest for management and conservation programs of this valuable species in the Caspian Sea.

Key words: Anzali, Hardy-Weinberg equilibrium, Genetic diversity, Microsatellite, Gharahsu, Common carp (*Cyprinus carpio*)

*Corresponding Author: ali_shabany@yahoo.com